



Wichtige Maßnahmen für Ihren Behandlungserfolg

Bitte beachten Sie folgende Verhaltensmaßnahmen nach Ihrem chirurgischen Eingriff

Den eingelegten Tupfer entnehmen Sie bitte erst nach 30 Minuten.

Bitte kühlen Sie an den ersten beiden Tagen den Operationsbereich ca. 10 Minuten, dann 10 Minuten Pause. Das Kühlmedium nicht direkt auf die Wange außen auflegen, sondern in ein dünnes Tuch oder Ähnliches einpacken. Nicht unterbrochen kühlen.

Bitte essen Sie erst wieder, wenn Sie kein Taubheitsgefühl mehr in den Lippen und der Zunge wahrnehmen.

Bitte beachten Sie, dass durch die örtliche Betäubung sowie Schmerzmedikamente die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein kann – dies gilt besonders im Hinblick auf die aktive Teilnahme am Straßenverkehr.

Bitte halten Sie Ihren Kopf stets aufrecht (nicht vornübergebeugt) und vermeiden Sie schweres Heben und anstrengende Arbeiten.

Wenn die Wirkung der lokalen Anästhesie nachlässt, kann es durch das Öffnen der Blutgefäße in den ersten 24 Stunden zu leichten Sickerblutungen kommen. Das ist normal und stellt kein Problem dar.

Sollte es zu einer Nachblutung kommen, können Sie für ca. 30 Minuten auf ein frisches angefeuchtetes Stofftaschentuch (kein Tempotaschentuch!) beißen. Alternativ können Sie auch eine sterile Kompresse aus Ihrem Verbandskasten verwenden.

Wenn die Blutung nach 45 Minuten noch nicht zum Stillstand gekommen ist, kontaktieren Sie bitte unsere Praxis unter der Rufnummer **09 11 – 61 80 00** (Praxis Schwabacher Straße) oder **09 11 – 55 33 34** (Praxis Ludwig-Feuerbachstraße).

Bitte putzen Sie weiterhin mindestens zweimal täglich Ihre Zähne – nicht jedoch den Operationsbereich.

Bitte verwenden Sie erst ab dem zweiten Tag eine Mundspüllösung (Chlorhexamed®, Dynexan®, Meridol®,...).

Bitte verwenden Sie auch Kamillespülungen oder Ähnliches frühestens ab dem zweiten Tag nach dem Eingriff.

Um einen Behandlungserfolg zu sichern und schwerwiegende Wundheilungsstörungen zu vermeiden sollten Sie 7 Tage nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und keine frisch gepressten Säfte sowie Zitrusfrüchte konsumieren.

Bitte 10 Tage auch keine Milchprodukte wie Joghurt, Milch und Käse konsumieren.

In den ersten 7 Tagen nach dem chirurgischen Eingriff sollten sie auch keinen Sport treiben. Vor allem Schwimmbad- und Saunabesuche sind nicht empfehlenswert.

Am Folgetag des chirurgischen Eingriffs ist eine Wundkontrolle zwingend vorgesehen. Dabei wird der Verlauf der Wundheilung kontrolliert, die Wunde gespült und ggf. störende Nahtenden gekürzt. Dieser Kontrolltermin ist wesentliche Voraussetzung für die Sicherung eines

erfolgreichen Behandlungsverlaufs.

Bitte verwenden Sie nur geeignete Schmerzmedikamente und beachten Sie dabei die Dosierungsvorschriften sowie die Packungsbeilage. Ggf. fragen Sie bitte auch Ihren Apotheker.

Spezielle Hinweise nach implantologischen Eingriffen sowie Augmentationen (Knochenaufbau)

Bitte bei Eingriffen im Oberkiefer für eine Zeitraum von 14 Tagen die Nase nicht mit Druck schnäuzen.

Verwenden Sie abschwellende Nasentropfen. Diese sind in der Regel nicht rezeptpflichtig und können in der Apotheke frei erworben werden.

Bitte beim Niesen oder Husten stets den Mund geöffnet lassen.

Bitte vor allem bei augmentativen Maßnahmen (Knochenaufbau) nicht mit den Fingern in die Wunde fassen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass regelmäßige Implantatkontrollen sowie Implantatreinigungen in Form einer professionellen Zahnreinigung (PZR) - mindestens 1x pro Halbjahr in unserer Praxis – erforderlich sind. Es wäre sehr schade, wenn Sie Ihren Behandlungserfolg dadurch aufs Spiel setzen (Gewährleistung).

Wir wünschen Ihnen eine gute, rasche und schmerzfreie Genesung!

Ihre Zahnarztpraxis

Dr. Krug & Kollegen

Weitere Infos auf www.drkrug.de

Datum

Name in Druckschrift

Unterschrift des Patienten

Praxis Süd

Schwabacher Str. 75
90439 Nürnberg

☎ 09 11 – 61 80 00

✉ info@drkrug.de

Praxis Nord

Ludwig-Feuerbachstr. 71
90489 Nürnberg

☎ 09 11 – 55 33 34

✉ info@drkrug.de



www.drkrug.de



@zahnarztpraxisdr.krug_kollegen

überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. Katharina Krug & Dr. Florian Krug